

Interacción entre diferentes factores cognitivos en la predicción de los síntomas de depresión (pp. 21-39)

Estibaliz Mateos-Pérez¹ y Esther Calvete²

¹*Universidad del País Vasco;* ²*Universidad de Deusto (España)*

Este estudio examinó un modelo etiológico de los síntomas de depresión en adolescentes, según el cual la relación predictiva entre las inferencias negativas (causas, consecuencias y self) y los síntomas de depresión estaba moderada por los esquemas disfuncionales tempranos. Este estudio examinó si los esquemas de los dominios de desconexión y rechazo y orientación a los demás acentuarían la vulnerabilidad a los síntomas de depresión tras la realización de inferencias negativas sobre eventos estresantes sociales. Así mismo, se evaluó si los esquemas del dominio de autonomía deteriorada y rendimiento interactuarían con las inferencias negativas sobre eventos estresantes de rendimiento para predecir incrementos en síntomas de depresión. Un total de 1184 participantes (54% chicos) con edades entre 13 y 17 completaron las medidas de esquemas disfuncionales tempranos e inferencias negativas en la línea base y síntomas de depresión en la línea base y en el seguimiento de seis meses. Los análisis de moderación muestran que los dominios de esquemas de naturaleza social aumentaron la relación predictiva entre inferencias negativas sobre eventos estresantes sociales y síntomas de depresión.