

**Trastornos de personalidad en fumadores y no fumadores de la población general**  
(pp. 241-258)

Elena Fernández del Río, Elisardo Becoña y Ana López  
*Universidad de Santiago de Compostela (España)*

El objetivo de este estudio fue evaluar y comparar la presencia de trastornos de la personalidad en una muestra de 202 fumadores que acuden a un tratamiento psicológico para dejar de fumar y de 211 no fumadores de la población general. Se utilizó el “Inventario clínico multiaxial de Millon-II” (MCMI-II; Millon, 1997). Los resultados muestran que los fumadores puntúan significativamente más que los no fumadores en la escala fóbica, la escala histriónica y la escala pasivo-agresiva. En cambio, los no fumadores destacan en la escala compulsiva. Se encontró que los fumadores puntúan más que los no fumadores en la escala de ansiedad, en la escala histeriforme y en la escala de neurosis depresiva, así como en la escala de sinceridad y de alteración. Esta relación se mantuvo una vez controlado el efecto del sexo y la edad de los sujetos. Concluimos que ciertos tipos de trastornos de la personalidad sí son más frecuentes en población fumadora, en concreto, el histriónico, el fóbico y el pasivo-agresivo. Los restantes subtipos necesitarían de una mayor investigación.